

Poučení rodičů po sedaci / analgosedaci dítěte

Vlivem použitých léčivých přípravků podaných v průběhu sedace / analgosedace dítěte při ošetření bude dítě ještě několik následujících hodin pod vlivem odeznívajících anestetik. Je velmi důležité, aby po celou dobu doznívající sedace / analgosedace bylo dítě pod zvýšeným dozorem. Ještě několik hodin po výkonu nebude fungovat paměť dítěte kontinuálně, ošetření proto dítěti nijak nepřipomínejte!

Dbejte prosím, aby nedošlo ke zranění dítěte pádem.

Dítě odneste v náručí do auta a z auta domů.

Zajistěte umístěním do vhodného prostředí, aby se dítě neporanilo, nemohlo spolknout či vdechnou drobné předměty.

Jídlo a pití podejte dítěti, až si o ně samo řekne, nenuťte ho.

V případě nutnosti tišení bolesti (například po extrakci zubů) použijte běžné léčivé přípravky, které podáváte dítěti v případě horečnatého onemocnění (NUROFEN sirup, IBALGIN sirup nebo PARALEN v čípcích) v dávkách dle hmotnosti dítěte, jak je uvedeno v příbalové informaci léčiva.

Do úplného odeznění sedace / analgosedace nenechávejte dítě bez dozoru.

V žádném případě neumísťujte dítě po sedaci / analgosedaci do školky či školy.

Další den již může mít dítě běžný režim (může bez obav do školky či školy).

V případě jakýchkoliv problémů či dotazů volejte prosím neprodleně anesteziologa: ☎ **603 418 304**